POTASSIO 30

Azote (N) total 3% dont : azote (N) uréique 3% Oxyde de potassium (K2O) 30% soluble dans l'eau.

Présentation du produit

- **Nom Commercial** : CIFOUMIC 10 10 10
- **Classe du produit** : Résistance aux conditions climatiques et au stress hydrique
- **Numéro d'autorisation de vente au Maroc** : 1224/DCPT/SPV/BPH/SI
- **Type de formulation** : Liquide
- **Composition chimique** : Azote (N) total 3% dont : azote (N) uréique 3% Oxyde de potassium (K2O) 30% soluble dans l'eau.
- **Mode d'action** : POTASSIO 30 : Formulation liquide riche en potassium pour utilisation par voie foliaire ou par fertigation.
  POTASSIO 30 : La qualité et la pureté de ses composants augmente l'efficacité nutritionnelle du produit.
  POTASSIO 30 : Le potassium est indispensable pour le métabolisme végétatif comme son pouvoir enzymatique activateur durant le processus de la photosynthèse et la synthèse des sucres et protéines.
  POTASSIO 30 : Les plantes traités avec du potassium deviennent fortes et plus résistantes aux conditions climatiques et au stress hydrique.
  POTASSIO 30 : La période d'utilisation recommandée est durant le grossissement des fruits et les stades finaux de cycle végétatif de la plante.
  POTASSIO 30 : Intensifie la coloration des fleurs et améliore la saveur, la couleur et la préservation des fruits.

Efficacité

Mode d'application	Culture	Dose
Par Fertigation	Arbre fruitiers à pépin et à noyau	100-120 Kg/Ha
	Agrumes	120-140 Kg/Ha
	Plantes potagères	10-12 Kg/1000 m²
	Plantes ornementales	10-12 Kg/1000 m²
Par Voie foliaire	Arbre fruitiers à pépin et à noyau	200-300 g/hl
	Agrumes	250-300 g/hl
	Plantes potagères	200-250 g/hl
	Plantes ornementales	200-250 g/hl
	Pépinières	200-250 g/hl

Conditions d'emploi

- **Mode d'emploi** : POTASSIO 30 peut être appliqué par voie foliaire ou par fertigation.
- **Période d'emploi** :
  Par fertigation :
  Sur les arbres fruitiers : De la formation des fruits jusqu'à la récolte,
  Sur les agrumes : Durant les dernières phases avant le repos,
  Sur plantes potagères : Du grossissement des fruits jusqu'à la récolte
  Sur cultures ornementales : lors des phases finales de production
  Par voie foliaire :
  Sur les arbres fruitiers : De la floraison au murissement,
  Sur les agrumes : A partir du grossissement des fruits,
  Sur plantes potagères : A partir du grossissement des fruits,
  Sur cultures ornementales : lors des phases finales de production
  Sur les pépinières : Avant le stade d'hiver

- **Conditionnement : 12 Kg.**